

УДК 531.19

## СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА СИСТЕМЫ СВЯЗАННЫХ МАЯТНИКОВ

© 2000 г. Академик В. В. Козлов

Поступило 30.05.2000 г.

### 1. СИСТЕМА СВЯЗАННЫХ МАЯТНИКОВ

Рассмотрим  $n$  маятников, соединенных упругими пружинами. Для простоты будем считать, что их точки подвеса совпадают. Колебания отдельно взятого маятника описываются гамильтонианом

$$h_s = \frac{y_s^2}{2J_s} - m_s g l_s \cos x_s,$$

где  $x$  – угол отклонения маятника от вертикали,  $y$  – сопряженный импульс,  $m$  – масса маятника,  $J$  – момент инерции относительно точки подвеса,  $l$  – расстояние от точки подвеса до центра масс,  $g$  – ускорение свободного падения.

Пусть маятники с номерами  $i$  и  $j$  соединены упругой пружиной. Тогда потенциальная энергия взаимодействия

$$h_{ij} = -\kappa_{ij} \delta^2 \cos(x_i - x_j) + \text{const.}$$

Здесь  $\kappa_{ij} = \kappa_{ji}$  – коэффициент упругости,  $\delta$  – расстояние до точек крепления пружины.

Пусть  $\gamma$  – набор номеров  $(ij)$ , для которых  $h_{ij} \neq \text{const}$ ; если  $(ij) \in \gamma$ , то  $(ji) \in \gamma$ . Множеству  $\gamma$  естественно сопоставляется граф  $\Gamma$ , вершины которого  $\{1, 2, \dots, n\}$  нумеруют маятники. Вершины  $i$  и  $j$  соединены ребром, если  $(ij) \in \gamma$ . Если граф  $\Gamma$  связанный, то систему маятников назовем связанной. Динамика системы связанных маятников описывается каноническими дифференциальными уравнениями с гамильтонианом

$$H = \sum_{s=1}^n h_s + \sum_{\gamma} h_{ij}.$$

Если граф  $\Gamma$  несвязен, то рассматриваемая система маятников распадается на несколько связанных подсистем, которые колеблются независимо друг от друга.

Мы будем рассматривать гамильтоновы системы несколько более общего вида. Пусть  $\mathbb{T}^n = \{x_1,$

$x_2, \dots, x_n \text{ mod } 2\pi\}$  – конфигурационное пространство,  $T = \frac{1}{2} \sum a_{ij} y_i y_j$ ,  $a_{ij} = \text{const}$ , – кинетическая энергия,  $V: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}$  – потенциальная энергия, которую будем считать тригонометрическим многочленом. Функция Гамильтона  $H$  – это полная энергия  $T + V$ .

Согласно предположению, ряд Фурье потенциала  $V$

$$\sum v_m e^{i(m, x)}, \quad m = (m_1, m_2, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}^n,$$

содержит конечное число гармоник. Конечное множество целочисленных векторов

$$S = \{m \in \mathbb{Z}^n: v_m \neq 0\}$$

назовем спектром потенциала  $V$ . Ясно, что  $S$  инвариантно при отражении  $m \rightarrow -m$ .

Кинетическая энергия  $T$  задает скалярное произведение в  $\mathbb{R}^n$ : если  $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$  и  $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ , то

$$\langle \xi, \eta \rangle = \sum a_{ij} \xi_i \eta_j.$$

Если  $\mathbb{R}^n$  можно разложить в прямую сумму подпространств  $W_1, W_2$ , ортогональных относительно скалярного произведения  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  и спектр  $S$  лежит в объединении  $W_1, W_2$ , то система с гамильтонианом  $H$  распадается на две независимые подсистемы с числом степеней свободы  $\dim W_1$  и  $\dim W_2$ . В этом случае исходная система будет иметь два дополнительных квадратичных первых интеграла, которые являются гамильтонианами отдельных подсистем. Если такое разложение невозможно, то систему будем называть связанной.

### 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Согласно Гиббсу, пребывание системы в определенном состоянии считается случайным событием. Таким образом, в фазовом пространстве  $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$  возникает плотность распределения вероятностей  $\rho(x, y)$ , которая неотрицательна и однозначна всюду в  $\mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n$ . Гиббс заметил, что  $\rho$  удовлетворяет уравнению Лиувилля и поэтому в слу-

чае гамильтоновых систем является первым интегралом.

В равновесной статистической механике ключевую роль играет распределение Гиббса

$$\rho = ce^{-\beta H}, \quad (1)$$

где  $\beta = (k\tau)^{-1}$ ,  $\tau$  – абсолютная температура,  $k$  – постоянная Больцмана. Постоянный множитель  $c$  находится из условий нормировки

$$\int \rho d^n x d^n y = 1.$$

Обычно распределение Гиббса выводится в предположении, что имеется  $N$  одинаковых, слабо взаимодействующих подсистем и в пределе (когда  $N \rightarrow \infty$ ) эти подсистемы в среднем распределены в соответствии с (1) (см., например, [1]; более строгое изложение в [2]). При этом делается еще одно существенное предположение: при сколь угодно малом взаимодействии подсистем гамильтонова система эргодична на фиксированных энергетических многообразиях. К сожалению, справедливость эргодической гипотезы очень трудно проверить [3]. Более того, зачастую она легко опровергается КАМ-теорией (например, для системы слабо связанных маятников).

В настоящей работе развивается другой подход к выводу гиббсовского распределения. Он основан на том, что типичная гамильтонова система не допускает однозначных интегралов, независимых от энергии  $H$  [4, 5].

### 3. ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Рассмотрим задачу о дополнительных интегралах системы с торическим конфигурационным пространством и гамильтонианом  $H = T + V$  из раздела 1. Более точно изучаются условия существования новых интегралов в виде полиномов по импульсам с однозначными на  $\mathbb{T}^n = \{x \bmod 2\pi\}$  коэффициентами. Отметим, что все известные интегралы обратимых механических систем суть полиномы по импульсам либо функции от этих полиномов. Этот факт используется в разделе 4, хотя в полном объеме он пока не доказан (частичные результаты в этом направлении указаны в [6, гл. II]).

Пусть  $\Sigma$  – выпуклая оболочка спектра  $S$  потенциала  $V$ . Ясно, что  $\Sigma$  – выпуклый многогранник. Пусть  $\alpha$  и  $\beta$  – вершины  $\Sigma$ , соединенные ребром  $\sigma$ . Назовем это ребро положительным, если  $\langle \alpha, \beta \rangle > 0$ . Положительные ребра видны из начала координат под острым углом.

Наш основной результат составляет

**Теорема 1.** Пусть  $W$  – гиперплоскость, содержащая начало координат и  $n - 1$  линейно-независимых вершин  $\Sigma$ . Если  $k$  каждой из этих вершин примыкает положительное ребро, не лежа-

щее целиком в  $W$ , то гамильтонова система не допускает полиномиального интеграла, независимого от энергии  $H$ .

Это утверждение доказывается с использованием результатов работы [7]. Достаточные условия отсутствия новых полиномиальных интегралов можно ослабить. По-видимому, теорема 1 справедлива для связанных гамильтоновых систем, о которых шла речь в п. 1. При  $n = 2$  этот результат установлен в [7]. Не исключено, что при  $n \geq 3$  связанные системы транзитивны на энергетических многообразиях

$$H = h > \max V. \quad (2)$$

Это одна из точных формулировок гипотезы о диффузии в гамильтоновых системах. Более простая задача: доказать отсутствие непостоянных непрерывных интегралов на энергетических поверхностях (2).

Из теоремы 1 выводится

**Теорема 2.** Связанная система маятников не допускает однозначного полиномиального интеграла, независимого от полной энергии.

### 4. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Применим теорему 2 для вывода канонического распределения Гиббса для системы маятников, соединенных упругими пружинами. С этой целью рассмотрим две связанные системы маятников с гамильтонианами  $H_1$  и  $H_2$ . Предположим, что некоторые маятники из систем 1 и 2 связаны между собой одной (или несколькими) упругими пружинами с очень малым коэффициентом упругости  $\epsilon$ . Тогда гамильтониан системы 1 + 2 будет иметь вид

$$\mathcal{H}_\epsilon = H_1 + H_2 + \epsilon W,$$

где  $\epsilon W$  – малая потенциальная энергия взаимодействия систем 1 и 2.

При каждом сколь угодно малом  $\epsilon \neq 0$  система маятников 1 + 2 будет связанной. Следовательно, по теореме 2 плотность распределения вероятностей в фазовом пространстве этой системы будет зависеть лишь от  $\mathcal{H}_\epsilon$ :  $\rho(\mathcal{H}_\epsilon)$ . Отметим, что эта функция может еще явно зависеть от параметра  $\epsilon$ ; но для дальнейшего это не существенно.

Устремим теперь  $\epsilon$  к нулю. В пределе получим две независимые системы с гамильтонианами  $H_1$  и  $H_2$ . Согласно общей идее Гиббса, следует ввести плотности распределения вероятностей  $\rho_1$  и  $\rho_2$ . По теореме 2 снова получаем, что  $\rho_1$  и  $\rho_2$  зависят только от  $H_1$  и  $H_2$  соответственно.

Применяя правило умножения для вероятностей независимых событий, получаем при  $\epsilon = 0$  равенство

$$\rho(H_1 + H_2) = \rho_1(H_1)\rho_2(H_2). \quad (3)$$

Это равенство называется еще гипотезой Гиббса о термодинамическом равновесии при исчезающем взаимодействии [1]. Хорошо известно, что решения функционального уравнения (3) – гладкие функции, нигде не обращающиеся в нуль. Последнее вытекает из условия нормировки. Из (3) получаем равенство

$$\frac{\rho_1'}{\rho_1} = \frac{\rho_2'}{\rho_2} = -\beta, \quad \beta = \text{const} > 0. \quad (4)$$

Отсюда вытекает формула (1) для системы с гамильтонианом  $\mathcal{H}_0$ . Поскольку  $\beta$  зависит лишь от температуры, то (4) проясняет физический смысл гипотезы Гиббса: температуры подсистем 1 и 2 остаются одинаковыми и при  $\epsilon \rightarrow 0$ .

Если имеется только одна связанная система маятников, то мы можем лишь утверждать, что ее плотность распределения вероятностей зависит от полной энергии этой системы. Как показано в [5], усреднение по такой инвариантной мере в общем случае несовместимо с аксиомами равновесной термодинамики. Причина понятна: у нас нет возможности определить температуру этой системы, сравнивая ее с температурами других систем.

Напротив, если имеются две связанные системы 1 и 2, соединенные между собой, то по истечении большого промежутка времени между ними установится термодинамическое равновесие. Это равновесие не нарушится, если бесконечно медленно и долго уменьшать взаимодействие между

системами 1 и 2. В пределе системы 1 и 2 окажутся независимыми, но будут иметь равные температуры. Каждую из них можно бесконечно медленно присоединить к третьей связанной системе с гамильтонианом  $H_3$  и плотностью распределения вероятностей  $\rho_3(H_3)$ . Условие сохранения термодинамического равновесия при таком соединении состоит в том, что  $\frac{\rho_3'}{\rho_3}$  равно аналогичным отношениям из равенства (4).

Работа выполнена при финансовой поддержке программы “Университеты России” и Федеральной целевой программы “Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки” (проект № 2.1–294).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зоммерфельд А. Термодинамика и статистическая физика. М.: ИЛ, 1955. 479 с.
2. Хинчин А.Я. Математические основания статистической механики. М., Л.: Гостехиздат, 1943. 128 с.
3. Кац М. Вероятность и смежные вопросы в физике. М.: Мир, 1965. 407 с.
4. Kozlov V.V. // Regular and Chaotic Dynamics. 1999. V. 4. № 2. P. 44–54.
5. Козлов В.В. // ДАН. 2000. Т. 370. № 3. С. 325–327.
6. Козлов В.В. Симметрии, топология и резонансы в гамильтоновой механике. Ижевск: Изд-во Удмурт. гос. ун-та, 1995. 432 с.
7. Козлов В.В., Трещев Д.В. // Мат. сб. 1988. Т. 135. № 1. С. 119–138.